

Absceso epidural después de anestesia regional para herniorrafía inguinal y umbilical.

Dr. Juan García Chienda*, Dr. Ernesto Chillitupa Concha**, Dr. Jaime Guevara Mantilla***, Dr. Walter Cruzalegui Lara****

RESUMEN

Presentamos el caso de un paciente que fue sometido a anestesia regional con catéter epidural para cirugía de corrección de hernia inguinal y umbilical y que luego de tres días presentara cuadro clínico de lumbo ciatalgia, con mas de veinte días de evolución, progresiva a dificultad para deambular, parestesias en miembros inferiores, pérdida de fuerza y fiebre por lo que es ingresado a UCI, demostrándose luego la presencia de micro abscesos epidurales por RM y compromiso inflamatorio vertebro discal, cuadro asociado a proceso asmático, hipertrofia de próstata e infección urinaria.

* Jefe del Centro Quirúrgico del H.C. PNP. Anestesiólogo.

** Jefe Adjunto del Centro Quirúrgico del H.C. PNP. Anestesiólogo.

*** Asistente del Centro Quirúrgico del H.C. PNP. Anestesiólogo.

**** Residente de Anestesiología del Centro Quirúrgico del HC. PNP. por la Facultad de Medicina Humana de la USMP.

