

### Panofalmitis en una Paciente con Esclerosis Sistémica

Paciente de 27 años con un tiempo de enfermedad de 6 años, caracterizado por presentar fenómeno de Raynaud, luego se agrega esclerodactilia y esclerodermia proximal, artralgias, le indicaron metotrexate 7.5mg y prednisona 15mg día. Una semana antes de la primera fotografía presentó cefalea, dolor en ojo izquierdo, progresivo y se agrega proptosis, secreción purulenta, por lo que es hospitalizada y recibe tratamiento antibiótico con cefalosporinas, la segunda fotografía dos semanas después de tratamiento antibiótico y drenaje quirúrgico de material purulento, después se llegó a la enucleación del ojo, la tercera imagen a los dos años del cuadro de panofalmitis, se encuentra con su prótesis ocular, en las tres fotografías se puede evidenciar la presencia de esclerodermia, telangiectasias en cara, la cuarta fotografía muestra la mano de la paciente con cambios severos de esclerosis sistémica. Dedos en garra, con resorción de falange distal de falange distal de los 5 dedos, hipo e hiperpigmentación.

Las infecciones en los pacientes con enfermedad difusa del tejido conectivo con frecuencia son severas, por la misma enfermedad y/o por el tratamiento, como son los corticoides, inmunosupresores y actualmente la terapia biológica.

Agradecimiento al Servicio de Reumatología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Dr. César Augusto Ugarte Escobar

Médico Reumatólogo, Profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.